




Patientinformation

till dig som får behandling med Nplate® (romiplostim)

Denna information vänder sig till dig som ska behandlas med NPLATE® (romiplostim). Har du frågor när det gäller din behandling med NPLATE® kontakta då alltid din läkare och / eller din sjuksköterska. Denna broschyr får endast lämnas ut av ansvarig läkare eller sjuksköterska.




Vad är ITP?

ITP, eller immunologisk trombocytopeni, är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av brist på blodplättar (trombocyter), de små blodceller som behövs för att stoppa blödningar. Trombocytopeni betyder brist på trombocyter och att denna brist är immunologisk betecknar att det är en rubbning i immunsystemet som är orsaken. Vid ITP producerar immunsystemet antikroppar som uppfattar kroppens egna trombocyter som främmande och därför förstör och rensar bort dem.

Symtom

Symtom som kan uppkomma i samband med diagnosen ITP är:

- Lilafärgade blåmärken som kan uppstå utan att man slagit sig.
- Petekier, små röda eller lilafärgade punktformiga prickar som orsakas av skador i kapillärerna, vanligen på underbenen.
- Underhudsblödningar, upphöjda lilafärgade svullnader som uppstår till följd av blödning eller blodansamling under huden.
- Näsblod och blödningar från andra slemhinnor. Blodblåsor i munnen kan också förekomma.



Varför är trombocytantalet lågt vid ITP?

ITP är en autoimmun sjukdom vilket innebär att immunförsvaret vänder sig mot någon del av den egna kroppen. Vid ITP är det trombocyterna som förstörs.

Vad händer i kroppen vid ITP?

1. Vid ITP förstörs trombocyterna snabbare än normalt samtidigt som benmärgen inte förmår producera tillräckligt många nya trombocyter. Följden blir ett lågt trombocytantal som kan öka blödningsrisken.
2. Cellerna i benmärgen som producerar trombocyter kan vara skadade vilket kan leda till att varje cell tillverkar färre trombocyter än normalt.
3. Trombopoetin, förkortat TPO, är en naturlig tillväxtfaktor som kroppen producerar för att signalera till benmärgen att det är dags att tillverka fler trombocyter. Vid ITP är nivåerna av TPO relativt låga och det bildas färre trombocyter i benmärgen.




Vad är Nplate?

Nplate (romiplostim) är ett protein som används för att behandla låga trombocytnivåer hos patienter med ITP.

Hur hjälper Nplate kroppen att tillverka fler trombocyter?

Benmärgen är den del av kroppen som producerar trombocyter. Nplate är en så kallad TPO-receptoragonist som stimulerar benmärgen att producera fler trombocyter.

Nplate är ett protein och verkar som den kroppsegeta tillväxtfaktorn trombopoetin. Genom att behandla din ITP med Nplate ökar antalet trombocyter och därmed minskar risken för blödningar.



Behandlingsmål

Målet med behandlingen är att minska risken för blödning samt att hålla antalet trombocyter på en nivå som minskar risken för blödningar.

Administrering

Nplate (romiplostim) ges en gång per vecka som subkutan injektion, alltså med en spruta i underhuds fett. Patienter med stabila trombocytnivåer kan efter beslut av överinseende läkare själva få injicera Nplate. Patienter som bedöms lämpliga för självadministrering får utbildning.

Eventuella biverkningar

Som alla läkemedel kan Nplate ge biverkningar. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, övre luftvägsinfektion och överkänslighetsreaktioner såsom utslag, rodnad och klåda. Tala med din sjuksköterska eller läkare om du upplever biverkningar.

Dosändring

Om du upplever symtom som du tror kan bero på ett lågt antal trombocyter kanske din dos av Nplate behöver ändras. Tala med din läkare som kan justera din dos så att du får en bra effekt av din behandling.

Nplate (romiplostim) Rx, ATC-kod: B02BX04.

Pulver till injektionsvätska, lösning 125 µg, avsedd för barn (ej förmån). Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 250 µg, 500 µg omfattas idag av läkemedelsförmånerna för vuxna patienter

Indikationer: Nplate är indicerat för behandling av primär immunologisk trombocytopeni (ITP) hos vuxna patienter som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider, immunglobuliner) Nplate är indicerat för behandling av kronisk primär immunologisk trombocytopeni (ITP) hos barn från 1 års ålder som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider, immunglobuliner)

Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne eller mot proteiner som härrör från *E. coli*.

Amgen Jan 2021.

För mer information läs bipacksedeln på www.fass.se

AMGEN

Amgen AB, Gustav III:s Boulevard 54, 169 27 Solna
www.amgen.se